25. Fleischrindtag

Donnerstag, 9.11.17

Demmin – Nossendorf

Kurzvorstellung Sanzkower Agrarproduktion GmbH & Co. KG und Uckermärkerzucht

Gliederung:

1. Betriebsdaten
2. Mutterkuhhaltung/Uckermärker
3. Daten zum Zuchtbetrieb
4. Produktionsorganisation



1. Betriebsdaten

Sanzkower Agrarproduktion GmbH & Co. KG
Sanzkow 65
17111 Siedenbrünzow

Stallanlagen:	Sanzkow und Nossendorf	
LN:	395	ha, davon AL 183 ha, GL 212 ha, Druschfläche 173 ha
Anbau 2018:	WG	26 ha
	WW	20 ha
	WR	45 ha
	WRaps	58 ha
	Erbsen	24 ha
	GL	212 ha
	ÖVF	10 ha
	Mais	nach Bedarf
Bodenarten:	S, l´S; 28 BP; sehr viele Steine	

2. Mutterkuhhaltung/Uckermärker

Beginn Mutterkuhhaltung ab 1990
Selektierte Kühe aus den Milchviehanlagen und Einkreuzung von Fleischrindern über Hereford- und Limousin-Deckbullen

Fleischrindzucht
Ende der 90er Jahre Zukauf von Fleckviehherdbuchtieren und Beginn der Zuchtarbeit

Uckermärker
Auf Anregung von Prof. Neumann im Jahre 2002 Zuchtbeginn
Einstieg über Neukreuzungsprogramm Uckermärker
Muttergrundlage = vorhandene Fleckviehpopulation
Jahr 2002 Zukauf von drei Charolais-Deckbullen (Ingo, Eckhard, Sixtus)
Über viele Jahre Rotationspaarung mit diesen drei Deckbullen
Jahr 2006 erster Zuchterfolg, Verkauf des Zuchtbullen „Ingfried“ an die Besamungsstation Woldegk
Weiterhin Verkauf von weiblichen und männlichen Zuchttieren in viele Uckermärkerzuchtbetriebe



3. Daten zum Zuchtbetrieb

Zuchtbetrieb der Rasse Uckermärker

Mutterkühe:	140	
davon Herdbuch:	65	
Weibliche JR zur Zucht:	25	
Tragende Färsen:	25	
Männliche JR zur Zucht:	10	
Deckbullen:	7	
X – GV:	220	
Reproduktion:	18 %	
Kälberverluste:	Totgeburten	6,5 %
	Verendung	2,3 %
Durchschnittliches EKA:	24 Monate	(Verbandsdurchschnitt 30 Monate)
Zwischenkalbezeit:	373 d	(Verbandsdurchschnitt 385 d)

Ingolf P (Uckermärker), Sanzkower Agrar, RA/V. Naschke, Schenkendöbern, RBB

4. Produktionsorganisation

Stallhaltung: Mitte November bis April (5 - 5,5 Monate)

Fütterung: AWS Gras/Heu/Stroh

Weidehaltung: Mai bis November (6,5 - 7 Monate)

Fütterung: Weidegras (größtenteils extensives GL)
Umtriebsweide (Tiere maximal eine Woche auf einer Koppel)
Zufütterung von Stroh, Heu, Mineralstoffgemisch

Abkalbung: konzentrierte Abkalbung Mai/Juni auf der Weide
ab 2006 Färsenabkalbung im Stall, dadurch besser Fütterung, Geburtenüberwachung, Mutter-Kalb-Bindung

Ab 15. Juli bis Weideabtrieb Deckbullen in den Herden

Weideabtrieb und Verkauf der Absetzer ab Mitte November

4. Produktionsorganisation

Intensive Aufzucht der weiblichen und männlichen JR zur Reproduktion

Fütterung: AWS Gras/Heu/Mischfutter

Bedeckung der weiblichen JR ab 14. Lebensmonat

Durchschnittliche Lebendmasse: 500 kg

Wägung der Absetzer im November

Ergebnisse: LMZ

	weibliche Absetzer	**männliche Absetzer**
Durchschnittsalter:	6 Monate	6 Monate
Durchschnittliche LMZ:	1.200 g/d	1.330 g/d
	255 kg	285 kg
Verbandsdurchschnitt:	1.109 g/d	1.250 g/d

Wägung der JR im April (Jährlinge)

	weibliche JR	**männliche JR**
Durchschnittsalter:	11 Monate	11 Monate
Durchschnittliche LMZ:	1.085 g/d	1.440 g/d
	400 kg	520 kg
Verbandsdurchschnitt:	971 g/d	1.364 g/d

Ingolf P (Uckermärker), Sanzkower Agrar, RA/V. Naschke, Schenkendöbern, RBB

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!!!