

## Ertragsniveau der LSV Winterroggen

(bei ortsüblicher Intensität, in dt/ha)

Da im Versuch Vorgewende, Leitspuren usw. die Parzellen nicht berühren, liegen die Durchschnittserträge bei gleich geführtem Pflanzenbestand ca. 15 bis 20 % höher als in der Praxis.

Alle Werte sind bereinigt vom Effekt wechselnder Sortimente und fehlender Versuche. Daher sind alle Werte unverzerrt direkt miteinander vergleichbar.

Stand: 26.08.2019	MV Süd					Jahres- niveau
	MV			BB	ST	
	Bornhof	Vipperow	Gülzow Sand	Lüch- feld	Beetzen- dorf	
Landkreis	MÜR	MÜR	LRO	OPR	SAW	
Ackerzahl	20	30	25-35	35-40	45	
langj.NI (mm)	549	609	559	554	575	
2014	72	120	95	96	112	<b>99</b>
2015	60	106	85	98	84	<b>87</b>
2016	74	106	101	85	110	<b>95</b>
2017	74	99	92		100	<b>91</b>
2018	29	89	84	62	86	<b>70</b>
2019	69	86	76		76	<b>76</b>
<b>Ortsniveau</b>	<b>63</b>	<b>101</b>	<b>89</b>	<b>84</b>	<b>94</b>	<b>86</b>