


01.09.2021 Gunnar Hirthe, Adelheid Elwert, Ann-Christin Hillenberg

Die Mehlig Kohlblattlaus (*Brevicoryne brassicae*) zählt zu den bedeutendsten Schädlingen an Kohlgemüse. Ihre Saugtätigkeit verursacht eine Verkrüppelung der jüngsten Blätter, wodurch bei starkem Befall auch die Kopfbildung beeinträchtigt werden kann. Die Bekämpfung der Mehlig Kohlblattlaus wird erschwert durch massive Wachausscheidungen und eine versteckte Lebensweise. Neben chemisch-synthetischen Insektiziden wurde im Versuch vorwiegend die Wirksamkeit von biologischen Insektiziden sowie von Hilfsstoffen mit wachsaufauflösenden Eigenschaften untersucht.



Mittlerer Wirkungsgrad gegen einzelsitzende Mehlig Kohlblattläuse bei Brokkoli, erfasst jeweils einen Tag nach erfolgter Applikation bzw. eine Woche nach letzter Spritzung (8. Kulturwoche). Abweichende Applikationstermine: Movento OD und Minecto One nur 3. und 5. Kw. BCP1015IB nur 3. und 4. Kw.; Pflanzung 24.06.21, letzte Bonitur 12.08.21

KONTAKT

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA)
Gartenbaukompetenzzentrum
Gunnar Hirthe
Dorfplatz 1 OT Gülzow / 18276 Gülzow-Prüzen
Telefon: 03843 789-221
g.hirthe@lfa.mvnet.de