



Körnerleguminosen – Rückblick auf die Saison 2025, Trends und Entwicklungen im Anbau

Magdalena Rangs, Beratung für Naturland

10.12.2025, Leguminosentag Online

Bildquellen, v.l.n.r.: UFOP, Schneider; Saatzucht Steinach, Runge; FiBL, Wilbois; UFOP, Schneider

Gefördert durch



Bundesministerium
für Landwirtschaft, Ernährung
und Heimat

Projekträger



Bundesanstalt für
Landwirtschaft und Ernährung

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

im Rahmen der BMLEH Eiweißpflanzenstrategie

im Rahmen der BMLEH Eiweißpflanzenstrategie

runge


legunet.de




Trockener und
milder Winter



Trockenes
Frühjahr



Juni wechselhaft, z.T.
Starkregenereignisse



Überdurchschnittlich nasser
Juli – Anfang August



Kaum
Auswinterungen

Gute Aussaatbedingungen

Bestandsetablierung

Trockenschäden, insbesondere
auf leichten Standorten

Je nach Region: Wasser rechtzeitig zur
Blüte oder Schäden durch Trockenheit



Schäden durch Lagerbildung u.ä.,
teilw. Einfluss der Hitze




Pilzkrankheiten

Ernteverzögerung

Klimatische Wasserbilanz Frühjahr


Langjährig

Klimatische Wasserbilanz mit Grasreferenzverdunstung
Frühling, Mittel 1991–2020




2025

Klimatische Wasserbilanz mit Grasreferenzverdunstung
Frühling 2025




Klimatische Wasserbilanz Sommer

Klimatische Wasserbilanz mit Grasreferenzverdunstung
Sommer, Mittel 1991–2020




Klimatische Wasserbilanz mit Grasreferenzverdunstung
Sommer 2025




Trocken/ Hitze-Schäden






Entwicklung der Anbaufläche in Deutschland




Mögliche Gründe?


(b) Anteil der geförderten Fläche am Ackerland (in %) im Bundesdurchschnitt und differenziert nach Bundesländern. Dunkelblaue Bundesländer lagen deutlich über dem Bundesdurchschnitt, hellblaue deutlich darunter.





Neue GAP: 2023-2027




Mecklenburg-Vorpommern – schon seit 2015 eine Förderung von 10% Leguminosen in der FF + Kombinierbar mit ÖR 2




Winterungen




Vicinarmut Ackerbohnen



Lupine




Zulassung von Soja-Sorten nach Reifestufe



Baden-Württemberg


■ Sojabohnen



0,8% d.
Ackerfläche

Niedersachsen

■ Sojabohnen



0,1% d.
Ackerfläche



Zusammenfassend...

- Anbau steigend – Wirtschaftlichkeit/ Förderung
- Verschiebung von Anbaupotentialen und Nachfrage nach Alternativen (Winterungen, Soja, Nischenkulturen) durch Klimaveränderung spürbar
- Auswertung durch fehlende Datenerfassung schwierig (Nischenkulturen!)
- Langfristige Entwicklung bleibt abzuwarten





Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

m.rangs@naturland-beratung.de

+49 1516 5905190