

SORTENEMPFEHLUNG

Winterfuttergerste 2026/27

Anbaugebiet: D-Nord/ MV-Süd

06.08.2026

Mehrzeilige Sorten

Sorten ohne Resistenz gegen Gerstengelbverzwergungsvirus:

Julia: stabile sehr hohe Erträge mit Vorteilen auf besseren Standorten, etwas geringeres Hektolitergewicht

Für den probeweisen Anbau nach zwei Prüffahren wird **Charmant** (sehr hohe Erträge mit Vorteilen auf besseren Standorten, auf Halmknicken und Zwergrost achten, reagiert auf reduzierten Einsatz von Fungiziden und Wachstumsreglern mit erhöhten Mindererträgen) empfohlen.

Bei guten betrieblichen Erfahrungen können folgende Sorten weiterhin zum Anbau empfohlen werden:

SU Hetti (sehr gute Strohstabilität, etwas geringeres Hektolitergewicht), **Avantasia** (hohe Erträge, etwas geringeres Hektolitergewicht, erhöhtes Halmknicken, auf Zwergrost achten), **Winnie** (hohe Erträge mit Vorteilen auf besseren Standorten), **SU Midnight** (geringeres Hektolitergewicht, auf Rhynchosporium und Halmknicken achten), **RGT Mela** (auf Halmknicken achten).

Sorten mit Resistenz gegen Gerstengelbverzwergungsvirus:

RGT Alessia: hohe Erträge, auf Zwergrost achten, reagiert auf reduzierten Einsatz von Fungiziden und Wachstumsreglern mit erhöhten Mindererträgen

Für den probeweisen Anbau nach zwei Prüffahren wird **KWS Chilis** (gute Erträge, auf Mehltau und Zwergrost achten, schwächere Strohstabilität, reagiert auf reduzierten Einsatz von Fungiziden und Wachstumsreglern mit erhöhten Mindererträgen) empfohlen.

Hybrid - Sorten

Die Erträge der Hybriden liegen auf dem Niveau der ertragsstärksten Liniensorten. Der wirtschaftliche Vergleich zu Liniensorten steht im Zusammenhang zu den jeweils realisierten Aussaatkosten und Aussaatstärken.

Nach zwei Prüffahren wird die Sorte **SY Colyseoo** (sehr hohe Erträge, gute Zwergrost- und Rhynchosporiumresistenz, geringerer Marktwareanteil) vorläufig empfohlen.

Bei guten betrieblichen Erfahrungen können die Sorten **SY Galileoo** und **SY Dakoota** weiter empfohlen werden.

Zweizeilige Sorten

Goldmarie: mittlere Erträge mit Vorteilen auf ertragsschwächeren Standorten, sehr gute Kornqualität, sehr gute Blattgesundheit, Standfestigkeit muss abgesichert werden, geringe Mindererträge bei reduziertem Einsatz von Fungiziden

Bei guten betrieblichen Erfahrungen könnte **Bordeaux** (mittlere Erträge, strohstabil, gute Kornqualität, auf Mehltau achten) weiter empfohlen werden.

			Kornertrag 2020-25			Reife- zeit	Pflan- zen- länge	Strohstabilität			Resistenz gegenüber				Qualität	
			BSL Note	relativ ¹	ohne Be- handlg. ²			Standfestigkeit	Halmsknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Zwergrost	BSL Note	
				(100% = 89,6 dt/ha)	(dt/ha)										HLG	Ma Wa anteil > 2,2
BYDV ³																
Mehrzeilig																
Julia			8	102	-10	m	m	+	-	+	+	+	o	o	5	8
SU Hetti			7	99	-12	m	m	++	+	o	o	o	o	-	5	9
Avantasia			7	101	-13	m	m	o	--	-	o	o	-	--	5	8
Winnie			7	100	-10	msp	l	o	o	-	o	+	o	+	6	8
SU Midnight			6	100	-11	m	m/l	o	--	o	+	o	--	+	5	7
RGT Alessia		x	7	100	-14	m	m/l	+	-	+	+	+	o	---	6	8
RGT Mela			7	100	-12	m	l	o	--	o	+	-	+	o	6	8
Charmant			8	102	-13	m	m/l	o	--	+	o	o	+	-	6	8
KWS Chilis		x	8	100	-15	m	m/l	-	-	+	-	+	+	---	6	7
SY Galileo	H		8	101	-11	m	m/l	-	-	-	+	o	o	+	5	7
SY Colyseoo	H		8	103	-10	m	m/l	o	-	o	o	o	++	++	6	6
SY Dakoota	H		8	101	-12	m	m	+	o	o	o	o	++	o	7-	6
Fascination		x	6	97	-7	m	k/m	++	o	+	o	o	+	++	6	8
SY Loona	H		8	100	-11	msp	m/l	o	-	o	o	+	++	+	6	5
SU Majella			7	100	-11	msp	m/l	++	o	o	+	++	+	-	6-	9
KWS Antonis			7	99	-15	m	m/l	-	-	+	-	o	-	-	6	8
SU Yette			6	98	-9	m	m/l	-	-	+	+	o	o	+	7	8
SY Zoomba	H	x	6	100	-11	m	m/l	-	-	o	o	+	++	o	6	7
Agathe			8	110	-12	m	k/m	++	+	++	o	+	--	-	6	8
KWS Celtis			8	104	-12	m	m/l	+	o	+	-	-	o	-	6	8
KWS Joris				104	-13											
SU Lenoria			7	98	-7	mf	m/l	+	+	++	++	+	o	+	5	8
Alice				102	-13											
KWS Exquis		x	7	98	-11	m	k/m	+	o	+	-	+	o	+	6	8
SY Baracooda	H		7	99	-13	m	l	o	-	-	o	o	+	--	6	7
Zweizeilig																
Goldmarie			7	99	-6	m	m	--	o	+	+	+	++	++	8	8
Organa		x	7	98	-9	msp	m	o	o	+	o	o	++	+++	6+	7
Bordeaux			6	98	-10	m	k/m	+	o	+	-	+	o	o	7	8
KWS Tardis			7	96	-8	m	k/m	++	+	+	-	+	++	o	7	8
KWS Andris			7	98	-6	m	k/m	+	o	+	o	+	+	+	7	8
Annemiek			7	102	-9	msp	k/m	o	o	+	o	+	+	++	7	8
Agostina			8	102	-7	m	k/m	o	+	+	-	+	o	o	6	8
Gerda			7	101	-9	m	m	o	+	++	---	+	o	+	6	8
LG Cascade			8	98	-8	m	k/m	-	+	+	-	+	+	+	7	8

H Hybride

¹⁾ gewichteter Mittelwert aus Stufe II (80%) und Stufe I (20%)

²⁾ Effekt ohne Behandlung = Minderertrag der Stufe I (reduzierte Intensität)

³⁾ BYDV = Gelbverzwergungsvirus (durch Insekten übertragen)

x resistent gegen Gerstengelverzwergungsvirus

x* zusätzlich resistent gegen Weizengelverzwergungsvirus

Gelbmosaikviren (bodenbürtig): fast alle Sorten haben eine Resistenz gegenüber mind. einem der drei Erreger; die konkreten Resistenzen entnehmen

Sie bitte der Beschreibenden Sortenliste des BSA

KONTAKT

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA)

Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft/Sachgebiet Sortenwesen und Biostatistik

Ahmad Ali

18276 Gülzow-Prüzen, Dorfplatz 1/OT Gülzow

Telefon: 0385/588-60234 – Fax: 0385/588-60011

a.ali@lfa.mvnet.de