

SORTENEMPFEHLUNG

Winterroggen und Wintertriticale 2026/27

Anbaugebiet: D-Nord/ MV-Süd

11.09.2026

Winterroggen

Hybridsorten (Nachbau lt. EG-Verordnung 2100/94 unzulässig!)

KWS Tayo: ertragsstark, mittlere Anbaueigenschaften, auf Braunrost achten

KWS Emphor: ertragsstark, gute Blattgesundheit

SU Erling: ertragsstark, gute Strohstabilität, mutterkornanfälliger

Das Sortiment kann um die beiden Sorten **KWS Baridor** (blattgesund) und **SU Karlsson** (gutes HLG) ergänzt werden. Beide erzielen mehrjährig knapp mittlere Erträge, die Standfestigkeit muss bei SU Karlsson abgesichert werden.

Von den Sorten SU Erling und SU Karlsson sind handelsübliche Z-Saatgut-Partien ausschließlich mit einer Zumischung von 10 % Populationsroggen im Verkauf.

Populationssorten

SU Bebop: aktuell ertragsstärkste Populationssorte

Die Populationssorten liegen mehrjährig mit den erreichten Erträgen etwa 15 bis 20 % unter den Hybridsorten, können aber auf reinen Sandstandorten wirtschaftliche Vorteile erzielen.

Wintertriticale

Fantastico: ertragsstark, standfest, auf Mehltau und Gelbrost achten, hohes HLG

Lombardo: knapp mittlere Erträge, winterfest, krankheitsanfälliger

Rivolt: mittlere Erträge, gelbrost- und mehltauanfälliger

Gute Ergebnisse vor allem bei geringerer Pflanzenschutzintensität erreicht die blattgesunde und winterfeste Sorte **Tributo**.

Als Ergänzungssorten für den gezielten Anbau langstrohiger Sorten werden **Bicross** (reift mittelfrüh, ertragsstark, Schwäche in der Winterfestigkeit, blattgesund, aber auf Mehltau achten) und vorläufig **Promiso** (ertragsstark, blattgesund, hohe Fusariumanfälligkeit) empfohlen.

KONTAKT

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (LFA)
Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft/Sachgebiet Sortenwesen und Biostatistik
Gabriele Pienz
18276 Gülzow-Prüzen, Dorfplatz 1/OT Gülzow
Telefon: 0385 588 60232
g.pienz@lfa.mvnet.de

Tabelle 1: Sortencharakteristik Winterroggen 2026

	Kornertrag 2020-2026			Pflanz. länge	Stand- festig- keit	Halm- knicken	Resistenzen gegenüber				Qualität	
	Note BSL	Ertrag ¹ relativ	ohne Beh. ²				Braun- rost	Mehl- tau	Rhyn- cho- spo- rium	Mutter- korn	Fall- zahl	HLG
Bezugsbasis dt/ha		83,4	dt/ha									
Hybridsorten												
KWS Tayo	8	100	-10	k/m	o	+	-	o	+	o	7	5
KWS Emphor	8	101	-10	k/m	o	+	o	+	+	+	8	5
SU Erling	8	101	-10	k/m	o	++	o	o	+	-	7	5+
KWS Baridor	7	99	-8	m	o	+	+	o	+	+	7	5
SU Karlsson	7	98	-10	m	-	-	o	o	+	o	7	6
KWS Fidalgor	8	102	-11	k/m	-	-	o	.	+	o	6	5
KWS Wisdor	8	103	-11	k/m	--	--	o	.	+	o	7	5
SU Fred	7	98	-9	m	o	o	o	.	+	+	6	5
2026 im ersten LSV-Jahr												
Farmaleo	.	103	-9	.	.	.	.	.	.	.	.	.
SU Fenn	9	101	-9	k/m	--	o	+	.	+	o	6	6
Populationssorten												
SU Bebop	2	83	-9	m/l	--	-	o	o	o	+	6	5

- 1) gewichteter Mittelwert aus Stufe II (80%) und Stufe I (20%)
2) Effekt ohne Behandlung = Minderertrag der Stufe I (reduzierte Intensität)

Tabelle 2: Sortencharakteristik Wintertriticale 2026

Bezugs- basis dt/ha	Kornertrag 2020-2026			Winter- festig- keit	Reife- zeit	Pflan- zen- länge	Stand- festig- keit	Resistenz gegenüber				Qualität	
	Note BSL	Ertrag ¹ relativ	ohne Beh. ² (dt/ha)					Mehl- tau	Blatt- sep- toria	Braun- rost	Gelb- rost	TKM	HLG
		89,4											
Fantastico	7	102	-9	+	m	k	++	--	+	o	-	-	+
Lombardo	7	99	-12	++	m	k/m	o	o	o	--	-	o	o
Rivolt	7	100	-12	o	m	m	+	--	o	o	--	-	-
Tributo	6	99	-5	++	m ^{sp}	k/m	o	+	+	+	+	o	-
Bicross	7	102	-8	o/-	m ^f	l	o	-	+	+	++	-	o
Lumaco	7	98	-7	o/-	m	m/l	-	+	+	o	++	-	o
Promiso	7	103	-7	.	m	m	+	+	+	+	++	-	o
Trimobe	7	102	-10	.	m	l	--	+	o	+	++	o	+
2026 im ersten LSV-Jahr													
Rendezvous	8	106	-8	.	m	l	--	o	+	o	++	-	o
RGT Comebac	8	105	-7	.	m	m	-	o	+	+	+	-	-
RGT Zigzac	7	98	-8	.	m ^f	k/m	o	o	o	o	++	o	o
Rugiro	7	103	-6	.	m	m	o	+	+	+	++	o	o

- 1) gewichteter Mittelwert aus Stufe II (80%) und Stufe I (20%)
2) Effekt ohne Behandlung = Minderertrag der Stufe I (reduzierte Intensität)